


BRONQUIOLITIS



¿QUÉ ES LA BRONQUIOLITIS?



La bronquiolitis se presenta cuando las vías aéreas más pequeñas de los pulmones del niño se hinchan, haciendo que tenga dificultad para respirar. Por lo general, la bronquiolitis es causada por un virus . Se presenta en niños menores de 2 años.

FACTORES DE RIESGO

No haber sido o no ser alimentado con leche materna exclusiva.

Convivencia con personas fumadoras.

Es más frecuente en niños menores de dos meses o en menores de 6 meses que hayan sido prematuros

Niños con enfermedades congénitas


Niños que tengan hermanos en guardería.

Asistencia a lugares en donde exista presencia de niños enfermos.


SÍNTOMAS



SIBILANCIAS
(RUIDO SIMILAR
A UN SILBIDO
AL RESPIRAR)



TOS



FATIGA



FIEBRE



RESPIRACIÓN
MUY RÁPIDA
(TAQUIPNEA)



ALETEO NASAL
O ESFUERZO
PARA RESPIRAR.



COMO EVITAR LA BRONQUIOLITIS

1
Evitar llevar a los niños menores de 6 meses a sitios con mucha gente

2
Mantener la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses, puesto que tiene efecto protector contra enfermedades.

3
Mantener vacunas al día

4
No exponer a los niños al humo del cigarrillo.

5
Lavarse las manos con agua y jabón antes de tocar al niño

6
Evitar enviar a su niño a la guardería, si se encuentra con un cuadro respiratorio o algún otro signo de enfermedad.

7
El uso de mascarilla del cuidador es esencial para impedir contagio por secreciones.

8
No compartir cubiertos ni vaso.

9
Higienizar con frecuencia juguetes, chupetes y superficies que entren en contacto con el niño y sus alimentos.

10
Ventilar los ambientes

11
Evitar que personas con fiebre o que presentan algún signo o síntoma de resfriado o tos estén en contacto cercano con su niño/a.



TRATAMIENTO EN CASA



- Controlar la fiebre y proveer confort al niño.
- Aumentar ingesta líquidos.
- Realizar limpieza nasal con suero fisiológico cuantas veces sea necesario.
- Si se alimenta con leche materna, debe tomarla con más frecuencia y durante más tiempo, de día y de noche.
- El niño debe seguir con la comida normal, pero se debe dar en pequeñas cantidades y ofreciéndosela más frecuentemente (cada dos o tres horas).
- la tos es un mecanismo de defensa del organismo, no una enfermedad.
- Evitar automedicar



CUANDO ACUDIR A URGENCIAS



Sonidos o silbidos al respirar



Respiración muy rápida o dificultosa



Costillas que se marcan en el tórax al respirar



Aspecto enfermo o letárgico




La piel, los labios o las uñas se ven azuladas



No come o bebe

Cada gesto de amor que brindas a tu bebé es una capa de protección. En tu abrazo, se teje el manto más fuerte contra cualquier adversidad.





GRACIAS

